

Szent Margit Kórház
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
Osztályvezető főorvos: Dr. Dr. Tüzkő Nándor
1032 Budapest, Bécsi út. 132
Telefon: Iroda tel.: 250-2420

Betegtájékoztató
(A beleegyező nyilatkozat 13. melléklete)

A Bartholin mirigy tályogja

Tisztelt Asszonyom!

Ez a tájékoztató azért készült, hogy segítse Önt annak megértésében, hogy az alábbi műtétnek mi a javallati köre, mi a technikai kivitele, s mik a következményei.

A Bartholin –mirigy a két nagyajak alsó harmadában elhelyezkedő külső elválasztású mirigy, melynek feladata a hüvelybemenet kellő nedvességének biztosítása. A mirigy kivezető csövében gennykeltő baktériumok juthatnak, s a gyulladás következtében a kivezető cső beduzzad, elzáródik, a mirigy által termelt váladék nem tud kiürülni, fertőződik, napok alatt tályog alakul ki. Ennek tünetei a hüvelybemenet egyik oldalán kialakuló egyre fájdalmasabb duzzanat, a beteg sem ülni, sem állni nem tud. Hőemelkedés, esetleg láz is jelentkezhet.

Kezelés nélkül a tályog áttör a nagyajak területén, a genny kiürül, s bár a panaszok megszűnnek, a későbbi kiújulás szempontjából nem előnyös a spontán kiürülést megvárni.

A betegség megoldása általában műtéti, a műtét altatásban történik, ezért kell éhgyomorra jönni. A beavatkozás vénás altatásban történik, lényege, hogy a tályogra rámetszünk, a gennyet lebocsátjuk, a tályogfalat lekaparjuk, az üreget fertőtlenítő oldattal átöblítjük és legtöbbször a sebszéleket 2-2 öltéssel, erszényszerűen kiszegjük, a sebet tamponáljuk.

A műtét kb. 10-15 percet vesz igénybe, a sebbe helyezett tampon célja a seb korai záródásának megakadályozása, azért, hogy a váladék kiürülhessen.

Műtét után osztályon helyezzük el, szükség esetén fájdalomcsillapítót kaphat.

Néhány órával a beavatkozás után felkelhet, zuhanyozhat, sőt a műtéti területet is megmoshatja.

A sebet néhány napig nyitva kezeljük. Majd a 4-5. napon a varratokat eltávolítjuk. Ha láztalan, panaszmentes aznap, 6 órával a beavatkozás után elhagyhatja a kórházat.

A varratszedésre orvosa vissza fogja rendelni.

A Bartholin mirigy cisztája

Sajnálatos módon ez a betegség 50-60%-ban visszatérhet, többszöri ismétlődés után ciszta alakulhat ki, mely nem fájdalmas, esetleg csak a szexuális életben okoz problémát. Ennek eltávolítása is műtét úton történik, de nem sürgősséggel. A kórházi felvétel napján altató orvos megvizsgálja, és előkészítés után a műtetre másnap kerül sor. Ennek során a bőrön metszést ejtünk, a mélyből a cisztát egészben kihámozzuk. A sebet legtöbbször drenáljuk, a további eljárás a fenti műtéthez hasonló.

Lévéen a Bartholin – mirigy páros szerv a betegség az ellenkező oldalon is kialakulhat és a fenti kezelések ismét szükségessé válhatnak. A betegség megelőzése érdekében fokozottan ügyeljen a gáttájék higiéniájára, kerülje a túl szoros ruhanemű viselését.

Amennyiben mindkét mirigy eltávolításra kerül, hüvelyszárazság esetén síkosító zselé alkalmazható.