

**Szent Margit Kórház**  
**Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály**  
Osztályvezető főorvos: Dr. Dr. Tűzkő Nándor  
1032 Budapest, Bécsi út. 132  
Telefon: Iroda tel.: 250-2420

**Betegtájékoztató**  
(A beleegyező nyilatkozat 5. melléklete)

**Konizáció, méhszájplasztika**

**Tisztelt Hölgyem!**

Ez a tájékoztató azért készült, hogy segítse Önt annak megértésében, hogy a méhszájon végzett műtéteknek mi a javallati köre, technikai kivitele, mik a következményei.

**A méhszájon végzett műtétek javallati köre két fő csoportra osztható:**

1. A szülések következtében kialakult méhszáj sérülés, amelynek eredményeképpen a zárófunkció romlik, ennek következtében gyulladás és gyakori folyás jön létre.
2. Cytológiai és kolposzkópos eltérés a méh hüvelyi felszínén vagy a nyakcsatornában, amelyből később rosszindulatú folyamat alakulhat ki. Ezek az elváltozások az éves nőgyógyászati rákszűrés keretében ismerhetők fel.

**Technikailag a műtétet kétféle módon végezzük. Az Önnel tervezett műtét típusáról kezelőorvosától kap tájékoztatást.**

Az egyik a hagyományos, ún. **éleskés konizáció**. A műtét során a méhszájból kúpszerű részt távolítunk el, melyet szövettani feldolgozásra elküldünk. A konizáció mélysége és nagysága az elváltozás jellegétől és a beteg életkorától is függ. A műtétet méhkaparással egészítjük ki. A beavatkozást altatásban, ritkábban vezetéssel érzéstelenítésben történik. A műtét végén a nyakcsatornába vékony műanyag csövet helyezünk be, amely a váladékot levezeti, és a méhnyak összetapadását megakadályozza. A cső kivételére a műtét utáni kb. 5. napon kerül sor. Pontos időpontot az operáló orvossal fognak egyeztetni.

A konizáció szövődménye lehet vérzés, gyulladás, ezek kezelést igényelnek. A méh-kaparásnál előfordulhat a méhfal sérülése, mely szövődmény többnyire veszélytelen és nem igényel további beavatkozást, ha mégis, akkor hastükrözéssel, /laparoszkópiával/ oldjuk meg. Hagyományos hasi műtét, esetleges méheltávolítás csak nagyon ritkán kerül szóba. A műtét után 2-3 napot kell nálunk töltenie, de pontos időpontot itt is a kezelőorvos fog mondani.

A műtét után ritkán a méhnyak hegesen záródik, ennek jele a görcsös, a megszokottól kisebb mennyiségű vérzéssel járó menstruáció. Ebben az esetben is vissza kell jönni osztályunkra vizsgálatra.

A másik módszer a méhszáj műtetre az ún. rádiófrekvenciás hurokkal végzett ún. **/Loop/ konizáció**. Ebben az esetben lényegesen kisebb területet távolítunk el, a szövettani diagnózis korlátozott értékű a hőkárosodott sebszélek következtében. Előnye a lényegesen gyorsabb gyógyulás, ritka a vérzéssel szövődmény, és még azon a napon haza lehet menni, a beavatkozás után 6 órával, felnőtt kíséretében. A Loop konizáció vénás altatásban történik a nőgyógyászati kisműtőben. De ezt a típusú műtétet csak bizonyos diagnózisok esetén lehet alkalmazni.

Ezt a műtéttípust is összekötjük méhkaparással a pontosabb kórisme felállításának érdekében.

Bármelyik típusú műtétet végeztük el Önnek, otthonában kímélő életmód, pihenés javasolt.

4-6 hétig az ülőfürdőtől és a házasélettől tartózkodjon.

Ha a műtét után terhességet vállal, gyakrabban jelentkezzen terhesgondozáson. A szülés során a tágulási szak megnyúlhat, de a hüvelyi szülés lehetséges.

Táppénz igényét a zárójelentéssel együtt kapott igazolás bemutatásával a házi orvosánál tudja érvényesíteni.

A szövettani lelet kb. 10 nap alatt készül el, feltétlenül jelentkezzen érte a műtétet végző orvosnál, mert ekkor lehet megbeszélni a további teendőket.

Kontroll vizsgálatra a következő menstruáció után kell jelentkeznie, illetve a kezelőorvosa által meghatározott időpontban.