

Szent Margit Kórház
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
Osztályvezető főorvos: Dr. Dr. Tűzkő Nándor
1032 Budapest, Bécsi út. 132
Telefon: Iroda tel.: 250-2420

Betegtájékoztató
(A beleegyező nyilatkozat 16. melléklete)

Méhszájzáró műtét /Cerclage/

Ez a tájékoztató azért készült, hogy segítse Önt annak megértésében, hogy a méhszájzáró műtétnek, mi a javallati köre, mi a technikai kivitele, mik lehetnek a következményei.

A méhszáj záró mechanizmusának igen jelentős szerepe van a terhesség zavartalan kiviselésében. Ez a funkció sérülhet korábbi műtéti beavatkozások, pl. terhesség megszakítás, több kiviselt terhesség során, de a méhszáj kinyílhat minden tünet és panasz nélkül - akár az első terhesség során is - veleszületett okok, pl. kötőszöveti gyengeség miatt. Ha a méhszáj kinyílik a 16. terhességi hét után, annak legtöbbször a burok fertőződése, idő előtti burokrepedés és a terhesség korai elvesztése, esetleg koraszülés lehet a következménye.

Méhszájzáró műtétet a terhesség alatt két fő javallat alapján végzünk:

- I. Gyógyító célzattal: ha a méhszáj a terhesség 16. hete után valamilyen ok miatt kinyílik
- II. Megelőző célzattal: ha a méhszáj teljesen, vagy részlegesen zárt, de a kórelőzményben kettő vagy több középidős vetélés, esetleg több terhesség megszakítás szerepel. Ilyenkor a műtétet a 18. és 28. terhességi hét között, de mindenképpen az AFP eredményének birtokában végezzük el.

Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a rendszeres méhtevékenység miatt kinyílt méhszáj műtétesen nem zárható, legfeljebb a fájások leállítása után végezhető el a beavatkozás.

A műtét vénás narkózisban történik, tehát semmilyen fájdalmat nem okoz. A lényege, hogy erős fonállal a méhnyakhám alá öltést vezetünk és ezzel a nyakcsatornát a belső méhszáj magasságában zárjuk. A műtét napján illetve másnap sem kelhet fel, kiszolgálásáról a nővérek gondoskodnak. A beavatkozás utáni második napon óvatosan felkelhet, fokozatosan terhelheti magát. A kezdeti véres, majd színes váladékozás néhány nap alatt megszűnik.

A műtét szövődménye lehet: vérzés, idő előtti burokrepedés, ritkán vetélés, illetve koraszülés. Ezek ellátására természetesen fel vagyunk készülve. Ha jól érzi magát és nincs szövődmény, a műtét utáni 4-5. napon otthonába távozhat.

Otthonában fizikai és pszichés kímélet, rendszeres terhesgondozói ellenőrzés javasolt. Házasélet, ülőfürdő a terhesség folyamán nem ajánlott. Görcsök, illetve a legkisebb vérzés esetén azonnali kórházi felvétel javasolt. A méhszájzáró öltés eltávolítása kb. egy héttel a szülés várható időpontja előtt történik meg.

Ha a terhességet zavartalanul kiviselte, a legközelebbi terhessége alatt is nagy valószínűséggel méhszájzáró műtétet fogunk végezni.