

Szent Margit Kórház
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
Osztályvezető főorvos: Dr. Dr. Tüzkő Nándor
1032 Budapest, Bécsi út. 132
Telefon: Iroda tel.: 250-2420

Betegtájékoztató
(A beleegyező nyilatkozat 18. melléklete)

SZÜLÉS

Tisztelt Asszonyom!

Önnek érdeke és joga is, hogy pontosan megismerje az Ön előtt álló eseményeket, és tájékozottságra alapozott döntést tudjon hozni a gyógyulása érdekében javasolt beavatkozásokról. Kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatót.

A tervezett beavatkozás neve latinul: Partus

A tervezett beavatkozás neve magyarul: Vajúdás és szülés levezetése

A tervezett beavatkozás ismertetése, indoka, célja:

A szülés folyamata három módon indulhat meg: a magzatburok megrepedése folytán elkezd folyni a magzatvíz, vagy rendszeres méhtevekenység, fájások jelentkeznek, esetleg magzati- vagy anyai ok miatt a szülés megindítására van szükség. A vajúdás során az elől fekvő rész, mely leggyakrabban a magzati koponya, ritkábban a magzati far, a fájások hatására a méhszájat kitágítja, ezt követően áthalad az anyai medencén, majd megszületik a magzat. A beavatkozás célja a magzat világra segítése.

A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

Anyai:

- nem kielégítő fájástevekenység esetén szükség lehet a fájások erősítésére infúzió segítségével
- sérülhet a méh-, a hüvely-, a gát-, a végbél-, a húgyhólyag
- amennyiben a méhlepény spontán nem születik meg, szükség lehet annak leválasztására
- a szülés után a méh ellazulhat, ezáltal fokozott vérzés alakulhat ki, mely vératömléstést tehet szükségessé
- amennyiben a vérzést más módon nem lehet csökkenteni, szükség lehet a méh eltávolítására
- az alkalmazott gyógyszerekkel szemben túlérzékenységi reakció léphet fel
- a vajúdás során kialakulhatnak olyan állapotok, melyek a szülés hüvelyi úton történő befejezése esetén az anyai életet veszélyeztethetik, vagy maradandó egészségkárosodást okozhatnak, ezért szükség lehet császármetszés elvégzésére.
- kialakulhat méhgyulladás, a gátmetszés sebének gyulladása, szétválása.

Magzati:

- oxigén hiányos állapot, sérülés (leggyakrabban a felső végtagokat mozgató ideg sérülése).
- A vajúdás során kialakulhatnak olyan állapotok, melyek a szülés hüvelyi úton történő befejezése esetén a magzati életet veszélyeztethetik, vagy maradandó egészségkárosodást okozhatnak, ezért szükség lehet császármetszés elvégzésére.

A tervezett beavatkozás elmaradásnak várható következményei:

Amennyiben anyai, magzati, esetleg mindkét okból a szülés megindítása orvosilag indokolt, ennek elmaradása esetén az anya, a magzat(ok) esetleg mindkettőjük életét veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodást okozó állapot alakulhat ki.