

Szent Margit Kórház
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
Osztályvezető főorvos: Dr. Dr. Tűzkő Nándor
1032 Budapest, Bécsi út. 132
Telefon: Iroda tel.: 250-2420

Betegtájékoztató
(A beleegyező nyilatkozat 9. melléklete)

Vulvectomia

Tisztelt Asszonyom!

Ez a tájékoztató azért készült, hogy segítse Önt annak megértésében, hogy a vulvectomia műtétnek, mi a javallati köre, mi a technikai kivitele és milyen következménnyel jár.

A vulvectomia a szeméremtest eltávolítását jelenti. A műtétnek 3 típusa létezik, mégpedig az egyszerű, a radikális /kiterjesztett/ és az ultraradikális forma a nyirokcsomók eltávolításával.

A vulva eltávolítását ritkán végezzük 60 éves kor alatt, csak akkor, ha rosszindulatú elváltozásról van szó, a műtét után ugyanis hegesedés következhet be, mely a bőr további zsugorodásával, sorvadásával jár. Ez a dyskomfort érzésen túl közösülési panaszokhoz vezethet, esetleg lehetetlenné teszi azt. Időskorban, ha a konzervatív kezelés eredménytelen, továbbá bármely életkorban, ha igazoltan a rosszindulatú elváltozás korai stádiumáról van szó, egyszerű vulvectomiát végzünk. A kiterjesztett műtét kompromisszumot jelent az egyszerű és az ultraradikális beavatkozás között. Ezt végezzük idős betegeken, illetve fiatalabb korban is, ha a szeméremtest rákos elváltozását diagnosztizáltuk. Ez a műtét a csikló eltávolítását is magában foglalja. Az ultraradikális műtétet annak igen nagy kockázata miatt csak ritkán végezzük.

A műtét előtti este tisztító beöntést adunk, és a szeméremszőrzetét leborotváltjuk.

A műtétet általában gerinc közeli érzéstelenítésben végezzük, ha ettől el kívánunk térni, erről időben tájékoztatást fog kapni. A jódos lemosás illetve a katéter behelyezése már érzéstelenítésben történik. A kimetszett területet csomós öltésekkel zárjuk, szinte mindig egy, vagy több draint helyezünk be. A műtét után természetesen fájdalomcsillapítót mindaddig kap, amíg szüksége van rá. A varratokat egyszerűbb esetben az 5-6. napon, kiterjesztett műtét esetén a 10-12. napon távolítjuk el. Az állandó katéter több napig marad a hólyagban. A műtétet követő napon felkelhet, kevés vérezgetése, váladékozása lesz, mely fokozatosan csökken és feltisztul.

Osztályunkat a varrat szedést követően másnap, harmadnap hagyhatja el, természetesen csak akkor, ha a műtétet végző orvos másképp nem rendelkezik.

Otthonában sokat pihenjen, ülőfürdő, hüvelyöblítés tilos.

Házaseletet a kontroll vizsgálatig ne éljen, amelyre a beavatkozást követően kb. 6 hét múlva kerül sor. Pontos időpontot orvosa fog mondani.

Roszhindulatú elváltozás esetén utólagos sugár- esetleg gyógyszeres kezelésre is szükség lehet, erről természetesen részletes tájékoztatást fog kapni.